

ลดอัตราการกัดแยกผ้าติดเชื้องานซักฟอกในโรงพยาบาลกุสุมาลย์

นางสาวเสถียรทอง ปัจจุมลีและคณะ

รพ. กุสุมาลย์/ satientong@gmail.com /093-4130781

บทนำ : การกัดแยกผ้าติดเชื้อโดยมาตรฐานงานซักฟอก จะต้องกัดแยกผ้าจากตึกให้ถูกต้องตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากผ้าติดเชื้อ จากการเก็บข้อมูล พบที่งานทันตกรรม งานชันสูตร มีอัตราการกัดแยกผ้าติดเชื้อไม่ถูกต้องมีสิ่งของแปลกปลอมติดมาเสื่อการวน ร้อยละ 0.11 และ 0.12 ในปี 2559,2560 ตามลำดับ

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดอัตราการกัดแยกผ้าติดเชื้อไม่ถูกต้องในงานทันตกรรมและงานชันสูตร

วิธีดำเนินการ : 1.วิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหาเทียบมาตรฐานงานซักฟอกและมาตรฐานงานป้องกันการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่ซักฟอก และทีมICC

2.ปี 2559-2560 สะท้อนความเสี่ยงการกัดแยกผ้าติดเชื้อเสื่อการวนและมีสิ่งแปลกปลอมให้หน่วยงานทราบ ปี 2561 ออกแบบเสื่อการวนใหม่สำหรับเจ้าหน้าที่ ไม่มีกระเป๋ามาตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อร่วมกับมาตรฐานงาน Dental safety goal ของงานทันตกรรม และงานชันสูตร

3.ใช้เสื่อการวนที่ออกแบบใหม่ในงานทันตกรรมและงานชันสูตรและติดตามสอบถามเก็บข้อมูลผลจากการทดลองใช้

4.สรุปวิเคราะห์ข้อมูลภายหลังการปรับวิธีการใหม่ และให้ข้อมูลย้อนกลับเจ้าหน้าที่งานทันตกรรมและงานชันสูตร

ผลการดำเนินการ : พบว่าภายหลังแก้ไขปัญหายังต่อเนื่อง พบอัตราการกัดแยกผ้าติดเชื้อไม่ถูกต้องในงานทันตกรรมและงานชันสูตรปี 2562-2563ร้อยละ 0 เจ้าหน้าที่พึงพอใจในการใช้เสื่อการวนที่ออกแบบใหม่ร้อยละ 100

สรุป : กระบวนการแก้ไขปัญหาลดอัตราการกัดแยกผ้าติดเชื้อไม่ถูกต้องในงานทันตกรรมและงานชันสูตร โดยการมีส่วนร่วมในผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมออกแบบ สามารถลดอัตราการกัดแยกผ้าติดเชื้อไม่ถูกต้องไม่มีสิ่งแปลกปลอมในเสื่อการวนของเจ้าหน้าที่ในงานทันตกรรม และงานชันสูตร ได้อย่างต่อเนื่อง

บทเรียนที่ได้รับ : การแก้ไขปัญหา โดยการเปิดโอกาส การมีส่วนร่วมทุกวิชาชีพทำให้พบกลวิธีที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานแก้ไขได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน